



FICHA TECNICA DE ARRAQUIS®

1. GENERALIDADES

a) Nombre comercial	:	ARRAQUIS®
b) Ingrediente activo	:	Benomyl
c) Clase de uso	:	Fungicida
d) Grupo químico	:	Benzimidazol
e) Formulación	:	Polvo mojable (WP)
f) Composición química	:	Benomyl 500 g/Kg Aditivos csp 1 Kg

2. PROPIEDADES FISICO – QUIMICAS

a) Aspecto	:	Polvo
b) Color	:	Blanquecino
c) Olor	:	Inodoro
d) Estabilidad en almacén	:	Estable en condiciones normales de manejo y almacenamiento, mantener absolutamente seco, bien ventilado y en un área de suficientes dimensiones para evitar contaminación de vapores.
e) Corrosividad	:	No Corrosivo
f) Inflamabilidad	:	No inflamable
f) Explosividad	:	No explosivo
g) pH	:	5- 9
h) Compatibilidad	:	ARRAQUIS® es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, incompatible con ácidos o bases fuertes y con oxidantes fuertes, evitar mezclas con productos que contengan cobre o azufre.

3. TOXICOLOGIA

b) Categoría toxicológica	:	LIGERAMENTE PELIGROSO-CUIDADO
c) Precauciones para su uso	:	Lea bien la etiqueta y asegúrese de entender bien la información antes de usar el producto. Conservar el producto en su envase original en buen estado, etiquetado y cerrado. Use equipos en buenas condiciones que no tengan fugas o



escapes, con boquillas en perfectas condiciones. No comer, beber ni fumar durante su preparación y aplicación. Después de su aplicación bañarse con abundante agua y jabón. Cambiarse de ropa. Evite su almacenamiento y/o transporte junto a productos alimenticios o medicinas de uso humano o veterinario. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Usar máscara, guantes de jebe y ropa protectora durante su manipuleo y al momento de la aplicación, también utilizar equipo de protección para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

4. MECANISMO DE ACCION

ARRAQUIS® produce la inhibición de la mitosis y la división celular (ensamblaje de beta-tubulina en la mitosis).

5. MODO DE ACCION

ARRAQUIS® es un fungicida sistémico con actividad protectora y erradicante. Se transloca por la xilema y protege los brotes presentes y los que se desarrollan después de la aplicación debido a su sistemicidad y largo efecto residual

6. FITOTOXICIDAD

No es fitoxico en los cultivos recomendados, si se sigue las indicaciones de la etiqueta acerca de las dosis y momento de aplicación.

7. MODO DE APLICACIÓN

Aplicar con equipos terrestres, calcular la cantidad de agua a emplear, agregar en el tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, luego se adiciona la cantidad del fungicida **ARRAQUIS®** de acuerdo a la dosis recomendada, luego se agita la mezcla; finalmente se adiciona el resto de agua y se procede a la aplicación del producto



10. FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar **ARRAQUIS®** en etapa de desarrollo vegetativo del cultivo y cuando haya presencia inicial de la plaga. El intervalo entre aplicación dependerá de la presión de infestación de la plaga o de las condiciones medioambientales.

11. PERÍODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación

12. USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		Dosis (kg/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Fusariosis del espárrago	<i>Fusarium oxysporum</i>	0.2-0.3	15	0.1

13. N° DE REGISTRO SENASA :

PQUA N ° 3212- SENASA

14. TITULAR DEL REGISTRO:

TALEX PERU S.A.C.

Calle René Descartes No 311Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.
Teléfono: 612-6565

15. IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR

TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.

Calle René Descartes No 311Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.
Teléfono: 612-6565

DEPARTAMENTO TÉCNICO
Agosto 2023