


<p>1. DENOMINACIÓN:</p> <p>2. COMPOSICIÓN:</p>		<p>Es una mezcla sinérgica de PRECURSORES DE GLUCOSA, CALCIO, MAGNESIO, VITAMINAS, OLIGOELEMENTOS y BETAINA combinando una acción tónica y energética, actividad lipotrópica y lipoactiva, y efecto ruminotónico. Todo ello ayudando a mantener y restaurar el equilibrio metabólico.</p> <p>Cada 1000 L contiene (g/L): Cloruro de calcio 400,00; Propilenglicol 145,00; Cloruro de magnesio 85,00; Glicerina 120,00; Sorbitol 50,00; Zinc (cloruro anhidro) 0.12; Manganeso (cloruro manganeso tetrahidratado) 0.12; Cobre (sulfato de cobre (II) pentahidratado) 0.12; Aromatizantes 2.0; Niacina 6.00; Clorhidrato de betaina 9.60; Excipiente acuoso aromatizado c.s.p. 1 000,00 L</p>
<p>3. FORMA FARMACÉUTICA:</p>	LIQUIDA GEL	
<p>4. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:</p>		
<p>4.1. Aspecto</p>	Suspension líquida gel	
<p>4.2. Color</p>	Blanco cristalino	
<p>4.3. pH</p>	6.8 - 7.2 (25°C, sol. Acuosa 2%)	
<p>4.4. Estabilidad en Almacén</p>	Estable durante 2 años bajo condiciones normales de almacenamiento.	
<p>5. DATOS CLÍNICOS:</p>		
<p>5.1. Especie de Destino</p>	Bovinos.	
<p>5.2. Indicaciones de uso</p>	CALCIOTEC® está indicado como SUPLEMENTO PREVENTIVO Y DE RECUPERACION PARA HIPOCALCEMIA E HIPOMAGNESEMIA y como coadyuvante en tratamiento de CETOSIS.	
<p>5.3. Contraindicaciones</p>	Ninguna	
<p>5.4. Precauciones especiales de uso</p>	Ninguna	
<p>5.5. Reacciones adversas</p>	Ninguna	
<p>5.6. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción</p>	No se han reportado.	
<p>5.7. Posología y modo de administración</p>	Administración vía oral.	
<p>Suministrar según necesidades de 500 ml a 2 litros por vaca</p>		
<p>• Vacas:</p>	500 ml en los primeros síntomas de parto.	
	500 ml, 6 horas después del parto y 500 ml a las 12 horas.	
	Repetir 500 ml a las 48 horas.	
<p>Comenzar ante los primeros síntomas de alumbramiento y hasta los 2 días siguientes al mismo.</p>		
<p>5.8. RECOMENDACIONES DE USO:</p>	Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo	
	Administrar directamente en boca.	
	No suministrar sin reflejo de deglución.	
	Agitar antes de usar.	
<p>5.9. Periodo de retiro</p>	Este producto no lo requiere.	
<p>6. DATOS FARMACÉUTICOS:</p>		
<p>6.1. Incompatibilidades</p>	No se han reportado.	
<p>6.2. Tiempo de vida útil</p>	18 meses.	
<p>6.3. Precauciones de almacenamiento</p>	Almacenar en lugar fresco y seco al abrigo de la luz solar y lejos de fuentes de calor y/o humedad. Los envases no deben estar en contacto con suelos y/o paredes.	
<p>6.4. Naturaleza y presentación del envase</p>	Frasco x 250 ml.	
<p>7. Reg. SENASA N°:</p>	A.036.004.1.00800	