


<p><b>1. DENOMINACIÓN:</b></p> <p><b>2. COMPOSICIÓN:</b></p>		<p>Mezcla compuesta por Vitaminas (A, B, D, y E), Acidos grasos OMEGA 3, FOSFOLIPIDOS e INMUNOESTIMULANTES, pensado para ser usado durante las primeras horas de vida de los terneros, No sustituye la administración de calostro pero actúa como un suplemento ideal.</p> <p>Cada 1000 L contiene: Aceite de Hígado de Bacalao 42 mg; Vitamina A 1600 UI; Vitamina D 200 UI; Vitamina E 10 mg; Biotina 10 mg; Excipientes c.s.p. 1 000,00 L</p>
<p><b>3. FORMA FARMACÉUTICA:</b></p>	LIQUIDA	
<p><b>4. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:</b></p>		
<p><b>4.1. Aspecto</b></p>	Suspension liquida	
<p><b>4.2. Color</b></p>	Amarillo Verdoso	
<p><b>4.3. pH</b></p>	6.8 - 7.2 (25°C, sol. Acuosa 2%)	
<p><b>4.4. Estabilidad en Almacén</b></p>	Estable durante 2 años bajo condiciones normales de almacenamiento.	
<p><b>5. DATOS CLÍNICOS:</b></p>		
<p><b>5.1. Especie de Destino</b></p>	Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, caninos, gatos.	
<p><b>5.2. Indicaciones de uso</b></p>	CALOSTEC® está indicado como Inmunoestimulante, Energizante y Vigorizante.	
<p><b>5.3. Contraindicaciones</b></p>	Ninguna	
<p><b>5.4. Precauciones especiales de uso</b></p>	Ninguna	
<p><b>5.5. Reacciones adversas</b></p>	Ninguna	
<p><b>5.6. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción</b></p>	<b>No se han reportado.</b>	
<p><b>5.7. Posología y modo de administración</b></p>	Administración vía oral.	
<p>• Terneros:</p>	10-50 ml/ternero.	
<p>• Potrillos:</p>	20 ml tras el nacimiento o en las siguientes horas. 15 ml cada 3 horas hasta la recuperación.	
<p>• Caballos:</p>	1 ml cada 10 kg de peso vivo por día. La dosis puede ser duplicada en casos severos.	
<p>• Corderos y Cabritos:</p>	3-4 pulsaciones de gatillo dosificador.	
<p>• Camélidos Sudamericanos:</p>	3-4 pulsaciones de gatillo dosificador.	
<p>• Perros y Gatos:</p>	De menos de 5 kg de peso: 1 ml/día.	
<p></p>	De más de 5 kg: 1 ml/día por cada 5 kg de peso.	
<p><b>5.8. RECOMENDACIONES DE USO:</b></p>	<p>Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo</p> <p>Administrar directamente en boca o mezclado con el alimento.</p> <p>Periodo de utilización recomendado hasta 2 meses.</p> <p>Agitar antes de usar.</p>	
<p><b>5.9. Periodo de retiro</b></p>	Este producto no lo requiere.	
<p><b>6. DATOS FARMACEUTICOS:</b></p>		
<p><b>6.1. Incompatibilidades</b></p>	No se han reportado.	

<b>6.2. Tiempo de vida útil</b>	18 meses.
<b>6.3. Precauciones de almacenamiento</b>	Almacenar en lugar fresco y seco al abrigo de la luz solar y lejos de fuentes de calor y/o humedad. Los envases no deben estar en contacto con suelos y/o paredes.
<b>6.4. Naturaleza y presentación del envase</b>	Frasco x 250 ml.
<b>7. Reg. SENASA N°:</b>	A.036.004.I.00800

