


<p><b>1. DENOMINACIÓN:</b></p> <p><b>2. COMPOSICIÓN:</b></p>		<p>Mezcla sinérgica de PRECURSORES GLUCOGENICOS, NIACINA, CLORURO DE COLINA, ALCACHOFA y el COMPLEJO LIPTOL. Con un efecto regenerador del hígado y actividad energizante, que ayudan en el mantenimiento de las necesidades metabólicas y evitan trastornos hepáticos.</p> <p>Contiene: Propilenglicol 25%; Sorbitol 1.0%; Aromatizantes 1.0%; Propionato de Sodio 5.0%; Acido DL-Malico 0.6%; Excipiente siliceo c.s.p. 100.00 %</p>
<p><b>3. FORMA FARMACÉUTICA:</b></p>	<p>Solido</p>	
<p><b>4. PROPIEDADES FISICO QUIMICAS:</b></p>		
<p><b>4.1. Aspecto</b></p>	<p>Polvo granulado</p>	
<p><b>4.2. Color</b></p>	<p>Blanco crema</p>	
<p><b>4.3. pH</b></p>	<p>6.8 - 7.2 (25°C, sol. Acuosa 2%)</p>	
<p><b>4.4. Estabilidad en Almacèn</b></p>	<p>Estable durante 2 años bajo condiciones normales de almacenamiento.</p>	
<p><b>5. DATOS CLÍNICOS:</b></p>		
<p><b>5.1. Especie de Destino</b></p>	<p>Bovinos, Ovinos.</p>	
<p><b>5.2. Indicaciones de uso</b></p>	<p>CETOTEC® está indicado en la Reducción del riesgo de cetosis. Convalecencia de la cetosis.</p>	
<p><b>5.3. Contraindicaciones</b></p>	<p>Ninguna</p>	
<p><b>5.4. Precauciones especiales de uso</b></p>	<p>Ninguna</p>	
<p><b>5.5. Reacciones adversas</b></p>	<p>Ninguna</p>	
<p><b>5.6. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción</b></p>	<p><b>No se han reportado.</b></p>	
<p><b>5.7. Posología y modo de administración</b></p>	<p>Administración vía oral.</p>	
<p>• Vacas Lecheras:</p>	<p>30 - 40 g diarios mezclados con el alimento, 3 semanas antes del parto hasta 6 semanas después.</p> <p>En caso de cetosis usar como apoyo al tratamiento veterinario 50 g cada mañana durante 3 días</p>	
<p>• Ovejas Lecheras:</p>	<p>3- 4 g diarios mezclados con el alimento desde 6 semanas antes del parto y hasta 3 semanas después.</p> <p>En caso de cetosis usar como apoyo al tratamiento veterinario 5 g cada mañana durante 3 días.</p>	
<p><b>5.8. RECOMENDACIONES DE USO:</b></p>	<p>Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo</p> <p>Administrar directamente en boca o mezclado con el alimento.</p> <p>Periodo de utilización recomendado hasta 2 meses.</p> <p>Agitar antes de usar.</p>	
<p><b>5.9. Periodo de retiro</b></p>	<p>Este producto no lo requiere.</p>	
<p><b>6. DATOS FARMACEUTICOS:</b></p>		
<p><b>6.1. Incompatibilidades</b></p>	<p>No se han reportado.</p>	
<p><b>6.2. Tiempo de vida útil</b></p>	<p>18 meses.</p>	
<p><b>6.3. Precauciones de almacenamiento</b></p>	<p>Almacenar en lugar fresco y seco al abrigo de la luz solar y lejos de fuentes de</p>	
<p><b>6.4. Naturaleza y presentación del envase</b></p>	<p>Saco x 25 kg.</p>	
<p><b>7. Reg. SENASA N°:</b></p>	<p>A.36.07.1.0765</p>	